

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

**非ピリン系総合感冒剤
コーセー感冒カプセルS
かぜ・発熱・せき**

第②類医薬品

〔コーセー感冒カプセルSの特徴〕

「かぜ」は日常多い病気で、上気道粘膜の急性炎症やアレルギー性疾患などによる呼吸器の急性炎症性疾患の総称です。上気道粘膜に炎症を生じると、頭痛・咳・発熱・くしゃみなどの症状がみられます。

コーセー感冒カプセルSは、熱を下げ、せき・痛みを鎮める成分を配合し、カプセルに充填した非ピリン系のかぜ薬です。



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人は
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小兒(15歳未満)
- (5) 高齢者
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人
心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死溶解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢、尿量減少等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、眼氣

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕

1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	2カプセル	
7才以上15才未満	1カプセル	3回
7才未満の乳幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を必ずお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセル剤の取り出し方：右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



〔成分・分量〕

6カプセル（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

エテンザミド 750mg チベピジンヒベンズ酸塩 75mg
 アセトアミノフェン 450mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 無水カフェイン 120mg
 添加物としてトウモロコシンデンブン、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、酸化チタンを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

〔お問い合わせ先〕

愛知県厚生農業協同組合連合会 保健資材課

電話 0561-62-3167

受付時間：午前9時～午後5時（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

製造販売元

愛知県厚生農業協同組合連合会

〒480-1155 愛知県長久手市平池901番地