

キクアカダマ

登録



商標

・：かぜぐすり：・

コウドン<sup>®</sup> (W)

KODON (W)

・株式会社 赤玉堂・

第②類医薬品

かぜぐすり

# コウドン<sup>®</sup> (W)

## 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

## 【用法・用量】

15才以上（成人）1回……1包 1日3回食後なるべく30分以内に服用する。

- \* (1)用法及び用量を厳守すること。  
(2)15才未満の小児には、服用させないこと。

## 【成分・分量】 1日量3包(1包1g)中

サリチルアミド ……………990mg      ジヒドロコデインリン酸塩 …………… 15mg  
アセトアミノフェン ……………600mg      dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩 …… 30mg  
無水カフェイン ……………90mg      クロルフェニラミンマレイン酸塩 …… 7.5mg  
添加物としてパレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、黄色4号(タートラジン)を含有する。

- 次の人は服用しないこと  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 服用が過ぎない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 配置期限経過後は服用しないこと

（注意）



A

2包(1g×2)入 ¥300.+税

製造販売元 株式会社 赤玉堂 奈良県橿原市曲川町2丁目7-13 TEL0744-22-0269

第②類医薬品

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

この使用上の注意は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

## △ コウドン(W) 使用上の注意

第②類医薬品

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児は服用しないこと 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること 5. 服用前後は飲酒しないこと 6. 長期連用しないこと

⊗ **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(6) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりぐらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 保管及び取扱上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)配置期限経過後は服用しないこと。

製造販売元 (株) 赤玉堂 連絡先電話番号 ☎0744-22-0269