

かぜ薬

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ユガトス[®]

シロップ。小児用

第2類医薬品
総合感冒薬

ユガトスシロップ小児用は非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、去痰剤、抗ヒスタミン剤などを配合した小児用総合感冒シロップ剤です。

ユガトスシロップ小児用は含まれている成分の作用により鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、発熱などのかぜの諸症状に効果をあらわします。



【使用上の注意】

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項も記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがある。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用前後は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(6)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

(裏面につづく)

(表面からのつづき)

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効 能】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用し、必要な場合には就寝前にも服用してください。また場合によっては1日6回まで服用できますが、1日6回服用する場合には、原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。

服用時にはよく振ってから、添付の目盛付カップ（目盛はmL）ではかかって服用してください。

年 齢	3歳以上 7歳未満	1歳以上 3歳未満	6ヵ月以上 1歳未満	3ヵ月以上 6ヵ月未満	3ヵ月未満
1回量	4mL	3mL	2.4mL	2mL	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成 分】 24mL中

アセトアミノフェン	300mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	10mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	無水カフェイン	50mg
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	カンゾウエキス	330mg

(カンゾウ1.65gに相当)

添加物として白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、香料、グリセリン、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。また開封後はできるだけ早く使用し、長期保存しないでください。
- (5)本剤は生薬エキスを配合しているため沈殿を生じることもありますが、薬効には変わりありません。よく振って服用してください。
- (6)服用のつど、ビンの口をよく拭いて、フタをよく締めてください。
- (7)目盛付カップはご使用のつど、水洗いなどして清潔に保管してください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

犬伏製薬株式会社 お客様相談窓口 電 話 088-692-2302
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

犬 伏 製 薬 株 式 会 社

徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示64-6

CC12改