

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かぜ薬

ユガトス®カプセルS

第2類医薬品
総合感冒薬

ユガトスカプセルSは非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、去痰剤、抗ヒスタミン剤などを配合した総合感冒薬です。

ユガトスカプセルSは含まれている成分の作用により鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、発熱などのかぜの諸症状に効果をあらわします。



【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(8)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(裏面につづく)

(表面からのつづき)

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

【効 能】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の1回量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

【成 分】 6カプセル中

アセトアミノフェン	900mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	無水カフェイン	75mg
ジヒドロコデインリン酸塩	15mg	カンゾウエキス	480mg

(カンゾウ1.92gに相当)

添加物としてトウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Naを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。また開封後はできるだけ早く使用し、長期保存しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

犬伏製薬株式会社 お客様相談窓口 電 話 088-692-2302
 受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

CC03

犬 伏 製 薬 株 式 会 社

徳島県板野郡藍住町東中富字東傍示64-6

ユガトス® カプセルS 第2類医薬品

第2類医薬品

かぜの諸症状(発熱,頭痛,せき等)の緩和に

かぜ薬

ユガトス® カプセルS

【効 能】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。大人(15歳以上) 2カプセル(1回量)

【成 分】

6カプセル中
アセトアミノフェン…900mg、クロロフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩…15mg、
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…60mg、無水カフェイン…75mg、カンゾウエキス…480mg(カンゾウ1.92gに相当)
添加物・トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、酸化チタン、
ラウリル硫酸Na

【注 意】

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

3. 服用に際しては、説明文書をよくお読みください。

4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

5. 小児の手の届かない所に保管してください。

6. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

使用期限 2016.2

製造番号 CC03

カンゾウエキス配合

犬伏製薬株式会社

徳島県板野郡藍住町東中富宇東傍示64-6
お客様相談窓口 電話 088-692-2302
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

6カプセル

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



CB12

ユガトス® カプセルS

第2類医薬品

ユガトス® カプセルS 第2類医薬品

