

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

# 後藤散 **かぜ薬**

第②類医薬品

顆粒

かぜの諸症状に総合的なききめをあらわす成分を配合した、さらさら顆粒タイプのかぜ薬です。



## 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

### 4. 服用前後は飲酒しないでください

### 5. 長期連用しないでください



## 相談すること

### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中痛み、過度の体温低下

(裏面につづく)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(口のかわき、眠気)
4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効 能** かぜの諸症状(発熱、頭痛、悪寒、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

**用法・用量** 下記の1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	15歳以上	15歳未満
1回量	1包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>  
用法・用量を厳守してください。

**成分と作用** 1包(1.3g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
アスピリン (アセチルサリチル酸)	450mg	解熱・鎮痛・抗炎症作用に優れています。非ピリン系です。
無水カフェイン	50mg	解熱鎮痛の効果を高め、脳の血流を改善して早く頭痛をなおします。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	10mg	気管支をひろげ、のどを楽にして、激しいせきをしずめます。
ノスカピン	10mg	せきの中枢に作用してせきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	アレルギーなどの症状を緩和し、くしゃみ・鼻水・鼻づまりに効果があります。

上記の有効成分のほかに、顆粒の有用性を高める目的で、以下の成分が配合されています。  
ケイヒ末、カンゾウ末、精製白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、トウモロコシデンプン、炭酸マグネシウム、アルミニウムグリシネート

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

 **うすき製薬株式会社**  
大分県臼杵市市浜997-1

お客様相談室(月~金 8:00~17:00)  
 0120-5103-81(ゴトサン、ハイ!)  
ホームページ [www.gotosan.co.jp](http://www.gotosan.co.jp)

副作用被害救済制度の問合せ先(独)医薬品医療機器総合機構  0120-149-931