

第②類医薬品

非ピリン系総合感冒薬

新キコデ®顆粒A

新キコデ顆粒Aは「かぜ」による11の諸症状を緩和する7種のすぐれた有効成分を配合した総合感冒薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気があらわれることがあります。）
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 授乳中の人
 - 高齢者
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬により、アレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害 ぜんそく	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき

〔成分・分量〕

成 分	3包中	主 な 作 用
非ピリン系 解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン 900mg	「かぜ」による悪寒、発熱、頭痛、のどの痛み、 関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミン マレイン酸塩 7.5mg	「かぜ」のひきはじめにみられるくしゃみ、鼻水、 鼻づまりのアレルギー症状に効果をあらわし ます。
鎮咳剤	チペピジンヒベンズ酸塩 45mg	気管支筋弛緩作用のある咳止め薬で、咳中枢に働 いて「せき」をしずめます。
気管支拡張剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩 30mg	気管支を拡げ、せきをしずめてのどを楽にします。
去痰剤	グアヤコールスルホン酸 カリウム 210mg	消毒作用のある去痰剤で、気道分泌を促進し、 「たん」をうすめ、はき出しやすくします。
カフェイン剤	無水カフェイン 150mg	解熱鎮痛薬の鎮痛効果を増強します。
ビタミン剤	リボフラビン 6mg	体内で消耗したビタミンB ₂ を補います。

添加物として、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、L-グルタミン酸Na、乳糖、白糖、グリチルリチン酸2Na、シクロデキストリン、トウモロコシデンプン、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕

下記の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
（成人）15才以上	1包	3回
11才以上 15才未満	2/3包	
7才以上 11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
1才以上 3才未満	1/4包	

〔用法・用量に関連する注意〕

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤は1才未満の乳児には服用させないでください。なお、1才以上であっても2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝・祭日を除く）
9：00～17：00

発売元 **チベニ製薬株式会社**

大阪府茨木市西穂積町3番8号

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**

兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地