

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。また、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。

非ピリン系
かぜ薬 ニューサール(糖衣錠)

第 2 類医薬品

ニューサールは熱、痛みによく効く成分2種類を配合した総合かぜ薬です。熱、のどの痛みをはじめ、かぜの諸症状によく効きます。

 『使用上の注意』

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 今までに本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないないでください

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザににかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
- (4) 授乳中の人。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| その他 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫(喉頭、まぶた、口唇等)、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。) |
| ぜんそく | |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合、

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

[成分及び分量] 一日量 (12錠)中

| 成 分 | 12錠中 | 作 用 |
|--------------------|-------|------------------------------|
| アセトアミノフェン | 420mg | 熱を下げ、痛みを鎮めます。 |
| エテンザミド | 800mg | |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.0mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を抑えます。 |
| 無水カフェイン | 120mg | 鎮痛効果を高めます。 |
| d,l - メチルエフェドリン塩酸塩 | 40mg | 気管支を拡張し咳を鎮めます。 |
| ノスカピン | 32mg | 咳中枢を抑制し咳を鎮めます。 |
| ヘスペリジン | 24mg | 炎症を鎮めます。 |

添加物として乳糖、パレイショデンプン、アラビアゴム、酢酸フタル酸セルロース、白糖、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

[効能又は効果]

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

[用法及び用量]

| | |
|-----------|------|
| 15才以上 | 1回4錠 |
| 7才以上15才未満 | 1回2錠 |
| 5才以上7才未満 | 1回1錠 |

1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用して下さい。

「用法及び用量に関連する注意」

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)5歳未満には服用させないで下さい。
- (4)錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込まないでください)



[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光のあたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。

お問い合わせ先

森田製薬株式会社 消費者相談窓口
電話 0954-62-2331
受付時間 午前8:30～午後5:00まで
(土・日・祝日を除く)

発売元



森田製薬株式会社

佐賀県鹿島市大字三河内甲960番地

製造販売元



カシマ薬品商事株式会社

佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12