

改訂年月 平成22年12月

ご使用に際し、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

柴胡桂枝湯エキス配合
かぜ薬

スパロンエース顆粒

第 2 類医薬

くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。スパロンエース顆粒は、かぜの症状の改善に古くから賞用されている漢方処方(生薬)の柴胡桂枝湯エキスと解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、去痰剤、などを効果的に配合した顆粒状のかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげ、健康な体への回復を助けます。



『使用上の注意』



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 今までに本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください
- 授乳中の人は本剤を使用(服用)しないか、本剤を使用(服用)する場合は授乳を避けてください。
- 過量服用・長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。
ぜんそく	

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

[効能又は効果]

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

[用法及び用量]

15才以上1回1包、11才以上15才未満1回2/3包、7才以上11才未満1回1/2包、3才以上7才未満1回1/3包、

1才以上3才未満1回1/4包を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

1才未満の乳児は服用しないでください。

「用法及び用量に関連する注意」

1. 用法、用量を厳守してください。

2. 小児に服用させる場合には、保護者の監督のもとに服用させてください。

3. 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

[成分及び分量] 一日量 (3包:1包1.5g)中

成分	配合量	主な作用
柴胡桂枝湯エキス 〔柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、 人參、大棗、甘草、乾生姜〕	760mg (処方換算量5、168mg)	発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、はき気などのあるかぜに特に効果があります。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状(鼻水、くしゃみ)をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめます。
d1-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、はげしいせきをしずめ、のどを楽にします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	のどにからむ痰をやわらかくして、出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をやわらげ、眠気を防止します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	ビタミンB ₂ を補給し、体力の回復をたすけます。
合成ケイ酸アルミニウム	1200mg	胃の粘膜を保護し、他成分による胃腸障害をおさえます。



添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリンNa、二酸化ケイ素、バレイショデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、香料を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光のあたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 1包の分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。

お問い合わせ先 消費者相談窓口
森田製薬株式会社
電話 0954-62-2331
受付時間 午前8:30～午後5:00まで
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

発売元  森田製薬株式会社
佐賀県鹿島市大字三河内甲960番地
製造販売元  カシマ薬品商事株式会社
佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12