

ご使用に際し、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

和漢生薬配合
かぜ薬

ジスコール顆粒

第2類医薬品

くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。ジスコール顆粒は、かぜの症状の改善に古くから賞用されているチクセツニンジン他3種類の生薬と解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤などを効果的に配合した顆粒状のかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげ、健康な体への回復を助けます。

⚠️「使用上の注意」

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている
又はその疑いのある小児(7歳以上15歳未満)。
(5) 高齢者。
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢、尿量の減少等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするとゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |

| | |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法及び用量】

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。

15才以上1回1包、11才以上15才未満1回2/3包、

7才以上11才未満1回1/2包、7才未満は服用しないでください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の監督のもとに服用させてください。



【成分及び分量】1日量 3包(4.5g)中

| 成分 | 配合量 | 主な作用 |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| アセトアミノフェン | 580mg | 炎症をおさえ、発熱、頭痛、関節痛をやわらげます。 |
| エテンザミド | 520mg | 熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | かぜのアレルギー症状(鼻水、くしゃみ)をおさえます。 |
| d-メチルエフェドリン塩酸塩 | 45mg | 気管支をひろげ、はげしいせきをしずめ、のどを楽にします。 |
| 無水カフェイン | 100mg | 脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をやわらげ、眠気を防止します。 |
| カンゾウ末 | 750.5mg | せきをしずめ、たんを出やすくし、のどの痛みを緩和します。 |
| ケイヒ末 | 300mg | 頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助けます。 |
| ショウキョウ末 | 300mg | かぜの諸症状を緩和します。 |
| チクセツニンジン末 | 1200mg | 健胃、解熱、鎮咳去痰作用があり、かぜで弱った体をいやします。 |

添加物:乳糖水和物、カルメロースカルシウム

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光のあたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 1包の分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



お問い合わせ先

西海製薬株式会社
電話 0942-92-2303(代)
受付時間 9:00～16:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元



西海製薬株式会社

佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

発売元



富山薬品株式会社

富山県富山市四方西岩瀬石瀬175