

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

かぜ薬

第②類医薬品

ポジョンホワイト[®]

ポジョンホワイトは、かぜから起こるいろいろな症状に対してすぐれた効果を発揮する白色のカプセル剤です。

〔⚠ 使用上のご注意〕

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
（眠気があらわれることがあります）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい。
- 服用前後は、飲酒をしないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難。
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮ふ上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

(➡裏面に続きます)

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、口のかわき、眠気
4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

年令区分	1回量
15才以上	2カプセル
12～14才	1カプセル

左記1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

●お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

●12才未満のお子さまには服用させないで下さい。

●用法及び用量をお守り下さい。

成分・分量

本品1日量（6カプセル）中

成分名	分量	作用
アセトアミノフェン	240mg	熱を下げ、頭痛・のどの痛み関節の痛みに効果があります
エテンザミド	900mg	
地竜エキス散 （原生薬400mgに相当します）	200mg	動物性の抽出成分で、かぜの発熱や悪寒によく効きます
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	中枢神経に作用してせきをしずめます
ノスカピン	48mg	
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せき、たんにも効果があります
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりの症状を改善します
キキョウ末	270mg	漢方薬でよく用いられる成分で、去たん作用があります
無水カフェイン	75mg	他の成分の働きを助けます

添加物として、ケイ酸Aℓ、パレイシヨデンブ、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Naを含む。

保管・取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡いただきます様お願い申し上げます。

製造販売元 株式会社廣昌堂 富山県射水市水戸田2841
TEL 0766-54-1007
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）