

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第②類医薬品

かぜ薬 風龍 <顆粒>

「風龍」は、高貴薬として解熱作用・抗炎症作用等に珍重されている「ゴオウ（牛黄）を配合した風邪薬です。ゴオウ（牛黄）のもつ解熱・抗炎症・解毒などの生薬の働きに、速効性のある洋薬を配合し、かぜの諸症状にすぐれた効き目を発揮します。

【特長】

- ◎ゴオウ（牛黄）のもつ、解熱・抗炎症などの生薬の効き目が、洋薬との協力作用であらわれ、かぜの諸症状によく効きます。
- ◎桂皮末（ケイヒ末）や甘草抽出成分の配合により、生薬特有の芳香と味があり、すぐに溶け、かぜの症状をすみやかに改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに感染している又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

【裏面に続く】

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりぐらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分及び分量と働き】

成 分	1日量3包中 (3包3600mg)	作 用
ゴオウ(牛黄)	3mg	牛の胆のう中にできた結石で、解熱作用・抗炎症作用に優れています。
アセトアミノフェン	720mg	熱を下げ頭痛や、のど、関節のいたみをやわらげるのによく効きます。
エテンザミド	300mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなど、アレルギーを抑えます。
クエン酸チペジジン	50mg	咳をとめ、痰をきりやすくします。
無水カフェイン	150mg	かぜによる頭痛をやわらげます。

添加物として、ケイヒ末(桂皮末)、グリチルリチン酸二カリウム(甘草抽出成分)、パレイシヨデンブ、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

【効能・効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

【用法・用量】

次の量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用すること

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1 包	3回	3才以上7才未満	1/3 包	3回
11才以上15才未満	2/3 包		1才以上3才未満	1/4 包	
7才以上11才未満	1/2 包		1才未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)



<お問い合わせ先>

御所薬舗株式会社 お客様相談室
住 所：〒639-2200 奈良県御所市1207番地
電 話：0745-62-3388(代表)
受付時間：午前9:00から午後5:00まで(土・日・祝日を除く)

製造販売元
御所薬舗株式会社
奈良県御所市1207番地