

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2014年5月：使用上の注意改訂

第②類医薬品

かぜ薬 アミドサンゴールド顆粒



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等

(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(3)授乳中の人。

(4)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児（7歳以上15歳未満）。

(5)高齢者。

(6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(7)次の症状のある人。高熱、排尿困難

(8)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプルスジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューとなる、息苦しい等があらわれる。

【表面からのつづき】

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気	
4. 5~6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること	

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用すること。

年齢区分	服用量(1回量)	年齢区分	服用量(1回量)
15歳以上	1包	11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包	7歳未満	服用しないこと

(用法及び用量に関する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】1日量 3包(4,500mg)中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	580mg	炎症をおさえ、発熱、頭痛、関節痛をやわらげます。
エテンザミド	520mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻みす、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	気管支を拡げ、せき、たんをしめます。
無水カフェイン	100mg	頭痛をしめます。
カンゾウ末	750.5mg	せきをしめ、たんを出しやすくし、のどの痛みを緩和します。
ケイヒ末	300mg	頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助けます。
ショウキョウ末	300mg	かぜの諸症状を緩和します。
チクセツニンジン末	1,200mg	せきをしめ、たんを切り、かぜで弱った体をいやします。

添加物：乳糖水和物、カルメロースカルシウム

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地
電話番号 0942-92-2303(代)
受付時間 9:00~16:00(土、日、祝日を除く)