

2019年11月
(文書制定年月)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

(かぜ薬)

第②類医薬品

“発熱・さむけ・頭痛によく効く”

カゼワンプレミアム

特 徴

カゼワンプレミアムは、発熱、頭痛、関節の痛みをやわらげるアセトアミノフェン、鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状に効果のあるクロルフェニラミンマレイン酸塩、せきを鎮めるd l-メチルエフェドリン塩酸塩、たんどの排泄を促進するチペジンヒベンズ酸塩、頭痛を和らげる無水カフェイン、かぜによって消耗した体力の回復を促すヘスペリジンをプラスし、発熱時に消耗されやすいビタミン補給にビタミンB1、B2などを配合した飲みやすいカプセルタイプのかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないこと。

5. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

(裏面に続く)

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	15歳以上	15歳未満
1回量	1カプセル	服用しないこと
服用回数	1日3回	

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 製剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

成分・分量 1日量（3カプセル中）

成分	分量	作用
アセトアミノフェン	800mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、のどの痛みなどを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支を拡張、呼吸を楽にし、せきを鎮めます。
無水カフェイン	100mg	頭痛を和らげます。
チアミンジスルフィド（持続性ビタミンB1）	10mg	消耗しがちなビタミンを補給します。
リボフラビン（ビタミンB2）	3mg	
ゴオウ	3mg	発熱を鎮めかぜによって消耗した体力の回復を促します。
ヘスベリジン	30mg	
チペピジンヒベンズ酸塩	40mg	すみやかにたんの排泄を促します。

添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、赤色3号、青色1号を含む。

【成分・分量に関連する注意】

本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン（ビタミンB2）によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 配置期限（外箱に記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
 至誠堂製薬株式会社 TEL.0745(62)5555
 受付時間 10:30～15:00（土、日、祝日を除く）
 お客様相談室へ

製造販売元



至誠堂製薬株式会社

〒639-2241 奈良県御所市茅原220-1

版No.1