



TRADE MARK

漢生薬入



かぜせきに

持続型ビタミンB₁ **牛黄** 配合



かぜ **リートン** カプセルC

SEIKO YAKUHIN KOGYO CO., LTD.

第②類医薬品

かぜリ-トンカプセルC

奈3-54-100

第②類
医薬品

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

成分・分量

 1日量(3カプセル)中

ゴオウ(牛黄).....	6.0mg
塩酸トリプロリジン.....	4.0mg
ビスベンチアミン(B.T.D.S).....	25mg
ラクチルフェネチジン.....	550mg
チベピジンヒベンズ酸塩.....	75mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩.....	60mg
無水カフェイン.....	75mg
添加物 赤色3号、黄色4号(タートラジン)、 ラウリル硫酸塩、亜硫酸水素ナトリウム、 酸化チタン、バレイシヨテンブン、 チョウジ、アラビアゴム	

用法・用量

大人15才以上 1回.....1カプセル
1日3回 白湯又は清水にて食後なるべく30
分以内に服用する。

(※薬物アレルギー特異体質者は服用せぬこと。)

注意

1. 次の人は服用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー
症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用
してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をし
ないこと
 3. 服用が適さない場合があるので、服用前
に医師、薬剤師又は登録販売者に相談する
こと
 4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
 5. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼
しい所に保管すること
 6. 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと
- 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

定価 4カプセル

¥600+



PUSH

配置期限

成光薬品工業株式会社

奈良県北葛城郡広陵町大塚739
相談窓口 0745-55-0044



服用に際して、この文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類
医薬品

かぜ リートン カプセルC

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排尿困難

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。



成光薬品工業株式会社

〒635-0834 奈良県北葛城郡広陵町大塚739
TEL 0745-55-0044 FAX 0745-55-5265