

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 総合かぜ薬

第②類医薬品

## パラローフかぜEXゴールド

**パラローフかぜEXゴールド**はのどの痛みをやわらげるトラネキサム酸をはじめ、せき、発熱、鼻水などかぜの諸症状に効果をあらわす7種の有効成分を配合した総合かぜ薬です。ご家族で服用いただけます(6歳以上)。

**⚠ 使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
口のかわき、眼氣
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

○かぜの諸症状（のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、発熱、悪寒（発熱によるさむけ）、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水又はお湯で、かまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
6歳以上11歳未満	1錠	
6歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

## 成分・分量

9錠（15歳以上の1日服用量）中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをしづめます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状をおさえます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せきをしづめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしづめ、たんを切ります。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
ヘスペリジン	60mg	ビタミンPの一種で毛細血管を強化するはたらきが広く知られています。
トラネキサム酸	420mg	のどのはれや痛みをしづめます。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、セルロース、ステアリン酸Mg

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用であるため、開封後は取り除くこと。
- (5) 開封後は、箱の内ブタの「開封年月日」欄に開封日を記入し、葉は説明文書とともに保管すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、開封後は、使用期限内であってもなるべく速やかに服用すること。
- (7) 錠剤表面に斑点があらわれることがあります、これは本剤に含まれるヘスペリジンによるものです。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

