

この説明文書は、
お薬とともに保
管し、ご使用の際
には、よくお読み
ください。

第②類医薬品 総合かぜ薬

抗炎症成分配合かぜ薬

新コンタックかぜアタックコア

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。) 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. 5日間を超えて服用しないでください

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病 (8) 次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
循環器	動悸
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中痛み、過度の体温低下、からだがだるい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつばりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。)
心筋梗塞	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。
脳血管障害	意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかき、眠気 4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合(特に熱が3日以上続いたり、また熱が反復したりするとき)は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器より品質が変わることがあります。(4) 使用期限を過ぎたものは、内袋(アルミの袋)を破棄してください。*使用期限とは、内袋(アルミの袋)の記載を必ずご確認ください。

湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、誤用による事故の原因になります。)* (外側に記載)を過ぎた製品は服用しないで、未開封の状態での使用期間をあらわします。

CONTAC Attackコア

新コンタックかぜアタックコア

速攻[※]

抗炎症成分(グリチルリチン酸二カリウム)

ウイルス・細菌など → 腫れ・痛みなど

炎症

イメージ

抗炎症成分配合で、のど粘膜の炎症の元から効く!

【効能】かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【成分と作用】6錠(1日量)中に次の成分を含んでいます。

【解熱鎮痛剤】イブプロフェン …450mg 熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。

【カフェイン剤】無水カフェイン …75mg かぜによる頭痛をやわらげます。

【抗炎症剤】グリチルリチン酸二カリウム …42.6mg のどや鼻の粘膜の炎症をしずめます。

【抗ヒスタミン剤】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 …3.5mg 鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。

【気管支拡張剤】dl-メチルエフェドリン塩酸塩 …60mg せきを抑え、呼吸を楽にします。

【鎮咳剤】デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物 …48mg せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。

【去たん剤】ブロムヘキシン塩酸塩 …12mg せきの原因となるたんを出しやすくします。

添加物:乳糖、セルロース、カルメロースCa、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアルコール、タルク、ステアリン酸Mg、酸化チタン、クエン酸トリエチル、ポリソルベート80

【用法・用量】次の量を、食後なるべく30分以内に、水又はお湯で、かまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
15歳未満	服用しないでください。	

＜用法・用量に関連する注意＞(1)用法・用量を厳守してください。(2)錠剤の取り出し方:右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強くおして、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



税 控除対象

第②類医薬品

開封口

発売元 Haleonジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1
お客様相談室 ☎ 0120-099-301
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5