

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

か ぜ 薬

レボチリンSカプセル

第2類医薬品

本剤は解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、中枢性鎮咳薬および無水カフェインをバランスよく配合した1回1カプセル服用の非βリニン系かぜ薬で、かぜの諸症状にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）

4. 服用前後は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(5) 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌 尿 器 | 排尿困難        |
| そ の 他 | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称                                                    | 症 状                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| シ ョ ッ ク<br>(アナフィラキシー)                                        | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(ステイブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 薬剤性過敏症症候群                                                    | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。                                |
| 肝 機 能 障 害                                                    | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                          |
| 腎 障 害                                                        | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。                                            |

裏面に続く

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 間 質 性 肺 炎     | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜ ん そ く       | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                  |
| 再 生 不 良 性 貧 血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。  |
| 無 顆 粒 球 症     | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                            |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

次の量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 1 カプセル  |
| 15才未満の小児  | 服用しないこと |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を厳守すること。

(2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 成分・分量

3カプセル（1日量）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分             | 含 量    | 成 分           | 含 量   |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| アセトアミノフェン       | 750mg  | チベジジンヒベンズ酸塩   | 45 mg |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5 mg | 無 水 カ フ ェ イ ン | 75 mg |

添加物としてセルロース、カルメロースCa、メチルセルロース、黄色4号（タートラジン）、ゼラチン、青色1号、赤色3号、黄色5号、ラウリル硫酸Naを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

■ お問い合わせ先 増田製薬株式会社 お客様相談係 電話 0744-27-4381

たい印

【受付時間 9時から17時まで 土、日、祝日を除く】



製造販売元

増田製薬株式会社

奈良県橿原市川西町429