

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要などきに読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

葛根湯配合のかぜ薬

ヒラミン®KⅡ

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
おこりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 15歳未満の小児
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
中枢神経機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精 神 神 経 系	めまい		

またに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜炎候群 (ステイブンスジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない 等が持続したり、急激に悪化する。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢、尿量減 少等があらわれる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、 発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜん そ く	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再 生 不 良 性 貧 血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、 息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼 吸 抑 制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

大人（15歳以上）……………1回 1包
1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

〔用法・用量に関する注意〕

定められた用法用量を守ってください。

【成分・分量】 1日量（3包）中

葛根湯エキス（27/100量）……………	1,350mg		
葛 根……………	2,160mg	桂 皮……………	810mg
生 姜……………	270mg	麻 黄……………	1,080mg
甘 草……………	540mg	芍 薬……………	810mg
大 棗……………	1,080mg		

より製した
乾燥エキス末

アセトアミノフェン…………… 630mg クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 7.5mg

ジヒドロコデインリン酸塩…………… 24mg グアイフェネシン…………… 150mg

無水カフェイン…………… 120mg

その他、添加物として結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、カルメロースカルシウム、ポビドン、バレイショデンプン及びアラビアゴム末を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折りかえし保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〈ヒラミンKⅡ〉は、かぜの初期症状に特に効果を発揮する葛根湯乾燥エキスを配合している顆粒剤の総合感冒薬です。

かぜは、寒気、関節・筋肉の痛みからはじまり、発熱、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛みなどの症状があらわれます。ヒラミンKⅡは、これらの初期症状を漢方薬「葛根湯」と各種の合成薬で緩和します。栄養と休養とヒラミンKⅡで、かぜをはやく追い出しましょう。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元：**松田薬品工業株式会社**

本社・工場 愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

〔受付時間 8:30～17:00
(土、日、祝日を除く)〕