

かぜぐすり・生薬配合

かぜ薬・生薬配合

かぜてんぐ

第②類医薬品

かぜぐすり・生薬配合



6包入

6包入

製造販売元

丸太中嶋製薬株式会社
奈良県御所市今住170

かぜぐすり・生薬配合

かぜぐすり・生薬配合

生薬配合 風天狗 第②類医薬品
かぜぐすり

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法及び用量

- 15歳以上 1回……………1包
- 11歳以上15歳未満 1回……………2/3包
- 7歳以上11歳未満 1回……………1/2包
- 3歳以上7歳未満 1回……………1/3包
- 1日3回毎食後なるべく30分以内に服用する。

成分及び分量 1日量3包(3,000mg)中

- アセトアミノフェン……………750mg
- 地竜乾燥エキス……………65mg
(原生薬換算量500.0mg)
- dL-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
- クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
- ノスカピン……………48mg
- 無水カフェイン……………75mg
- チンピ末……………600mg
- ショウキョウ末……………600mg
- 添加物としてバレシヨデンブ、乳糖、ゼラチン含有する。

注 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 意 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
- 3. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
- 4. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

6包入(1包1000mg)

¥1000+税



外箱



外装フィルム
分包

配置期限

6包入

風天狗 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないこと
 (眠気等があらわれることがある。)
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。(4) 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病、高血圧
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発 赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲が ない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白 目が黄色くなる)、褐色尿、全身の だるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむ くみ、全身のだるさ、関節痛(節々 が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたり すると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが 急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒュー と鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、 皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労 感、動悸、息切れ、気分が悪くなりく らっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等 があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような
症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する
こと 口のかわき、眠気

4.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止
し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
すること

用法および用量について

外箱記載の用法・用量を厳守し、小児に服用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。

お問い合わせ先 **丸太中嶋製薬株式会社**

奈良県御所市今住170 TEL 0745-67-0006