

キクテングカゼクスリ 第②類医薬品

〔効能〕

かぜの諸症状（のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

〔用法用量〕

15才以上……………1回1包
1日3回食後なるべく30分以内に服用する。

〔成分分量〕 3包(2100mg)中

アスピリン……………600mg
アセトアミノフェン……………450mg
無水カフェイン……………150mg
添加物としてd-ボルネオール、無水ケイ酸、バレイ
シヨデンブンを含有する。

〔注意〕

- 次の人は服用しないこと
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して、ぜんそくを起こしたことがある人。
(3)15才未満の小児。
(4)出産予定日12週以内の妊婦。
- 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 服用に際しては添付文書をよく読むこと
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること

2包(1包700mg×2)入
¥200+税



袋、分包

配置期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

キクテング カゼクスリ


第②類医薬品




奈良県御所市今住170
丸太中嶋製薬株式会社
お問い合わせ先 0745-67-0006

第②類
医薬品

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読み下さい。

キクテングカゼグスリ 使用上の注意 

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・
事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、
乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用時は飲酒しないこと

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 高熱
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って
医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。

丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170 TEL0745 (67) 0006