

かぜのねつ・せき・痛みに

非ピリン系

総合かぜ薬

# 新スコールA

第②類医薬品

発売元

株式会社 西川栄寿堂

奈良県高市郡高取町清水谷1025  
お問い合わせ先 TEL 0744-52-3225



## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

## 効能・効果

かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

## 用法・用量

大人(15歳以上)……………1回2錠  
7歳以上15歳未満……………1回1錠  
7歳未満は、服用しないこと。

1日3回水又は温湯にて食後なるべく30分以内に服用すること。

(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン……………660mg  
無水カフェイン……………100mg  
コロールエナラミンマレイン酸塩 ……7.5mg  
エテンザミド……………400mg  
d-メチルエフェドリン塩酸塩 ……45mg  
クエン酸ナペビジン……………45mg

添加物:セルロース、CMC-Ca、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セラック、ポリビニルアルコールジエチルアミルアセテート、ソルビタン脂肪酸エステル、アラビアゴム、デキストリン、寒梅粉、トウモロコシデンプン、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、白糖、ゼラチン、サラシミツロウ、カルナウパウ、黄色4号(タートラジ)を含有する。

製造販売元 大和合同製薬株式会社 奈良県橿原市川西町632-1

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
4. 5~6回服用しても症状がよらな場合は服用を中止し、この場合は登録販売者に相談すること。口のかわき、無気味

3. 服用後、次の症状があらわれれば、次のような症状の持続又は増強が見られる場合は、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。口のかわき、無気味

症状の名称	症状
服用後すぐ(1)皮膚のかゆみひんまし(2)皮膚のかゆみ、じんまし(3)皮膚のかゆみ、じんまし(4)皮膚のかゆみ、じんまし	副腎、意欲の減退等があらわれる。
高熱、目の赤み、目やに、発熱のたどたど(5)高熱、目の赤み、目やに、発熱のたどたど(6)高熱、目の赤み、目やに、発熱のたどたど	皮膚副腎障害候症が持続したり、急激に悪化する。
皮膚のかゆみ、じんまし(7)皮膚のかゆみ、じんまし(8)皮膚のかゆみ、じんまし(9)皮膚のかゆみ、じんまし(10)皮膚のかゆみ、じんまし	発熱、かゆみ、発熱、黄疸(皮膚や白目が黄色(なる))、副腎不全、異常に悪化する。
肝機能障害	褐色尿、全身ののだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	胸焼け、息苦しさ、たん、呼吸困難、呼吸困難等からみられる。息苦しさ、たん、呼吸困難等があらわれる。
ぜんそく	息苦しさ、たん、呼吸困難等があらわれる。
再生不良性貧血	顔あざ、鼻血、歯ぐき出血、発熱、皮膚や粘り、たん、呼吸困難等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、たん、けい、のどの痛み等があらわれる。

2. 服用後、次の症状があらわれる場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
皮膚:発赤、発赤、かゆみ、潰瘍、吐き気、嘔吐、食欲不振、過度の体温低下、精神神経系:めまい、頭暈、めまい、脱臼、四肢麻痺、その他:過度の体温低下、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

12.03

総合かぜ薬

使用上の注意



2012.3改訂(記載要領変更に伴う改訂)

読みかた

相談する

4錠入 夫 300+税 配剤期限