

第②類医薬品

かぜ・せき・痛みに **新スコルA**

登録商標



金魚印

非ピリン系総合かぜぐすり
かぜのねつ・せき・痛みに

第②類
医薬品

新スコルA

奈良県橿原市川西町632-1
大和合同製薬株式会社
お問い合わせ先TEL0744-27-3325
月曜～金曜/AM9:00～PM5:00
(土、日、祝日を除く)

効能・効果

かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法・用量

大人(15歳以上) 1回2錠 7歳以上15歳未満 1回1錠 1日3回水又は温湯にて食後なるべく30分以内に服用すること。
7歳未満は、服用しないこと。

(用法・用量に関連する注意) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン 660mg、エテンザミド 400mg、無水カフェイン 100mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 45mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、クエン酸チベジシ 45mg、添加物:セルロース、CMC-Ca、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セラック、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ソルビタン脂肪酸エステル、アラビアゴム、デキストリン、寒梅粉、トウモロコシデンプン、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、白糖、ゼラチン、サリシミツロウ、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)を含有する

12錠入 2日分

かぜに新スコルバ

第②類医薬品



2014.9改訂(記載要領変更に伴う改訂) 総合かぜぐすり 14.09

⊗してはいけないこと ⚠使用上の注意

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
 1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。) 4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

Ⓜ相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかったことがある又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ/ 消化器：吐き気、嘔吐、食欲不振/ 精神神経系：めまい/ 泌尿器：排尿困難/ その他：過度の体温低下
 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状	症 状	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。	ぜんそく	息をするときせーせー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvenson氏症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。	無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。	間質性肺炎	胸焼けをうったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が認められた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気 4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

¥600+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



あける
↑



第②類医薬品

かぜに新スコルバ

- 保管及び取扱い上の注意
- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 - (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

配置期限

