

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

かぜに みみとん

第2類医薬品

●かぜにみみとんとかぜの諸症状

かぜにみみとんは熱を下げるのにすぐれた効果を発揮する生薬の地竜工キスを配合したかぜ薬で、熱・のどの痛みをはじめ、かぜの諸症状を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 透析療法を受けている人。
- 2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する
内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 3 服用前後は飲酒しないこと
- 4 長期連用しないこと



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。高熱
 - (5) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿瘍症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の丘疹胞の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(骨々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 3 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に服用

1回量

成人(15歳以上)	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包
7歳未満は服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



成分・分量

1日量(3包中 2,400mg)

アセトアミノフェン 750.0mg
発熱、悪寒、のどの痛みに効く成分です。

無水カフェイン 120.0mg
頭痛を抑える成分です。

クエン酸チペピジン 60.0mg
気管支をひろげてせき、たんの症状に効く成分です。

グアヤコールスルホン酸カリウム 250.0mg
たん切れをよくする成分です。

地竜乾燥エキス(原生薬換算量492.8mg) 64.0mg
発熱を抑える成分です。

添加物としてカンゾウ末、合成ケイ酸アルミニウム、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロースを含む。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お問い合わせ先

- 連絡先 ワキ製薬株式会社 お客様相談室
住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
電話 0120-200-114
受付時間 午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

WAKI ワキ製薬株式会社
〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
URL: <http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)