

かぜにねっ・せき・づつうに 8

かぜに

ねっ
せき
づつう

第②類医薬品

ゴオウ・TDS配合



和田製薬株式会社

奈良県御所市池の内340

和漢薬ゴオウ 配合

Piradon

総合感冒薬

新 **ピラドン** エース
カプセル

非ピリン 6カプセル

かぜにねっ・せき・づつうに 8

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



箱



外装フィルム

8

第②類医薬品
新 ピラドン エース
カプセル

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水・鼻づまり・くしゃみ・のどの痛み・せき・たん・悪寒・発熱・頭痛・関節の痛み・筋肉の痛み)の緩和。

用法及び用量

大人(15才以上)1回1カプセル、1日3回食後なるべく30分以内に服用のこと。(カプセルは嚙まずにそのまま水又は温湯にて服用のこと。)

成分及び分量 1日量(3カプセル)中

日 局	ゴオウ	3mg
日 局	アセトアミノフェン	800mg
日 局	チペピジンヒベンズ酸塩	40mg
日 局	dL-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg
局外規	チアミンジスルフィド	10mg
日 局	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
日 局	無水カフェイン	100mg
日 局	リボフラビン	3mg

添加物として、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、カプセル(ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、赤色3号、青色1号)を含む。

配置期限
△注意

- 次の人は服用しないで下さい。
 (1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 (3)15歳未満の小児。
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
- 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。

 6カプセル(6回分) 本体価格
 2日分 ¥800.(税別)

 製造販売元
和田製薬株式会社
 奈良県御所市池の内340
 TEL 0745-62-5624

かぜに新ピラドニエースカプセル

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また必要なときに読めるように保存してください。

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。
- 服用後、眠気があらわれることがあるので乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
- 服用時は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

⊕ 相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。(4)高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 高熱、排尿困難の症状のある人。
 - 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります、その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 口のかわき症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

⚠ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。