

第2類医薬品

香蘇散配合かぜ薬 かぜソフトG 顆粒

— 非ピリン系 —

「かぜ」にかかると全身に倦怠感が強く現れ、お仕事や家事など日常生活に支障をきたし、さらに体力を消耗して思わぬ病気をひき起こすもどともなります。

かぜソフトG顆粒は古くから「かぜ」に用いられている漢方薬「香蘇散」を配合した非ピリン系のかぜ薬です。「香蘇散」をはじめ各成分が協力的に働いて、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛などの「かぜ」の諸症状を緩和します。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある)
4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊娠婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人は (4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満) (5)高齢者 (6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (7)次の症状のある人:高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、縫内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こる場合があります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんま疹、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステアーズジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目にやに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小臍泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
中毒性皮表裏死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
肝機能障害	発熱、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をご覧ください。

無顆粒球症

突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法及び用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数	年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	3才以上7才未満	1/3包	3回
11才以上15才未満	2/3包		3才未満	使用しないこと	
7才以上11才未満	1/2包				

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

成分及び分量

3包(成人の1日服用量)中

はたらき	成 分	含量
かぜによる不快なたん、せきを抑えます。	dL-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg
かぜによる悪寒や発熱をおさえ、頭痛や関節、筋肉の痛みをしずめます。	エテンザミド	600mg
かぜによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった諸症状を緩和します。	アセトアミノフェン	540mg
かぜによる諸症状の改善を補助します。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
古くから「かぜ」に用いられている漢方薬	無水カフェイン	75mg
	香蘇散	2,200mg
	コウブシ末 800mg	
	チンピ末 600mg	
	ソヨウ末 400mg	
	カンゾウ末 200mg	
	ショウキョウ末 200mg	

添加物として、安息香酸、カルメロースCa、ポビドン、タルクを含有します。 (1包1,425mg)

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。
(4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 渡辺薬品工業株式会社

富山市水橋北馬場1番7

TEL. 076-479-9123

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931