

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

1747

A(0418)

こうそさん

香蘇散配合 カゼンエス 非ピリン系かぜ薬顆粒

【特徴】

カゼンエスは、古くから「かぜ」に用いられている漢方薬「香蘇散」をはじめ、非ピリン系解熱鎮痛薬、鎮咳薬、抗ヒスタミン薬、無水カフェインなどを配合し、服用しやすく、胃の中でとけやすい顆粒状にしたかぜ薬です。

カゼンエスは、「かぜ」による発熱、せき、痛み、鼻水などの諸症状にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがある。）

4. 服用前後は飲酒しないでください。 5. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満の小児	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 本剤は用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量（3包中） [1包量 1500mg]

成 分		分量(3包中)	主な作用
非ピリン系 解熱鎮痛薬	アセトアミノフェン	540mg	「かぜ」による発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みに効果をあらわします。
	エテンザミド	600mg	
鎮咳薬	ノスカピン	30mg	せきの中枢に働いて、せきをしずめます。
抗ヒスタミン薬	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	「かぜ」のひきはじめにみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状に効果をあらわします。
カフェイン類	無水カフェイン	120mg	脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をしずめます。
漢方薬	香蘇散 〔コウブシ末 800mg〕 〔ソヨウ末 400mg〕 〔チンピ末 600mg〕 〔ショウキヨウ末 200mg〕 〔カンゾウ末 200mg〕 の混合粉末	2200mg	胃腸の弱い人の「かぜ」に古くから用いられている漢方薬で「かぜ」による悪寒、頭痛などに効果があります。

添加物として、乳糖、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、デヒドロ酢酸Na、その他2成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 配置期限のすぎた製品は使用しないでください。

