

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。



# のどの痛み・せき・鼻水・熱に ちくじん 竹参かぜまる

◇◇◇ Cold remedy ◇◇◇

かぜは多くの場合、ウイルスによる気道粘膜（のど・鼻）の炎症が原因です。そのため、のどの痛み、鼻水・鼻づまり、せき、たんなどの症状や、発熱・悪寒・頭痛などの全身症状があらわれてきます。

## ●竹参かぜまるとかぜの諸症状

竹参かぜまるは、解熱・鎮痛・鎮咳・去痰作用などを有する成分に更に生薬をバランス良く配合した総合感冒薬です。

### △ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
 

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
 

（眠気等があらわれることがあります。）
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 授乳中の人は
  - (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
  - (5) 高齢者
  - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (7) 次の症状のある人
 

高熱、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人
 

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、経内腔
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スイーピース・ショック症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小紅斑)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(筋肉が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒュヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりにくっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 成分と作用

1包(1.5g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用	
解熱鎮痛剤 アセトアミノフェン エテンザミド	193.3mg 173.3mg	熱を下げる、のどの痛み、頭痛、関節の痛みをやわらげます。	
抗ヒスタミン剤 クロロフェニラミン マレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをやわらげます。	
気管支拡張剤 dL-メチルエフェドリン塩酸塩	15mg	せきを抑え、気管支をひろげてたんの排出を助けます。	
カフェイン剤 無水カフェイン	33.3mg	かぜによる頭痛をやわらげます。	
	カンゾウ末	250.2mg	かぜの症状をやわらげ、痛みを鎮めます。
生 葉	ケイヒ末	100mg	熱を下げる、痛みをやわらげます。
	ショウキョウ末	100mg	せきを鎮めます。
	チクセツニンジン末	400mg	せきを鎮め、たんを切り、かぜで弱った体をいやします。

添加物として乳糖水和物、カルメロースカルシウムを含有します。

## 效能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



## 用法・用量

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量
15歳以上	1包
11歳以上 15歳未満	2/3包
7歳以上 11歳未満	1/2包
3歳以上 7歳未満	1/3包
1歳以上 3歳未満	1/4包
1歳未満	服用しないこと

## （用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

## かぜの養生活

### (1) 栄養

抵抗力をつけるため、ビタミン・カロリーに富んだ食事をバランス良く摂りましょう。また、消化の良いもの、あたたかいもの、水分の多いものを摂るようにこころがけましょう。

### (2) 休養

無理せず、充分睡眠を取り、体を休めましょう。

### (3) 保湿・保湿

部屋を温かく保ち、汗ばんだ下着は早く着替えて、体を冷やさないようにこころがけましょう。入浴は熱が下がってから1~2日後にしてください。部屋に湯気をたて、空気の乾燥を防ぎましょう。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折りかえして保管し、2日以内に服用してください。
- (5) まれに白い粒などが発生したり、顆粒がかたまることがあります、無水カフェインの配合のためですので、そのまま服用してもさしつかえありません。

お問い合わせ先  
株式会社タキザワ漢方廠 お客様相談室 ☎ 048-688-7923  
受付時間：9時から18時（月～金）

タキザワ漢方  
株式会社タキザワ漢方廠  
ホームページ：takizawa.asia  
受付時間：9時から18時（月～金）