

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 総合かぜ薬

# 生薬配合 カイゲン顆粒

第②類医薬品

### 特徴

カイゲン顆粒は、発熱や悪寒、頭痛、鼻水、せきなど、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわす非ピリン系で、生薬を配合した顆粒状のかぜ薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

#### 4. 服用前後は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください

#### ☞ 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壞死溶解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
* 薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面に続く)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、頭痛、せき、たん、くしゃみ、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



## 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	8才以上 ～11才未満	5才以上 ～8才未満	3才以上 ～5才未満	3才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用させないでください

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

3包(6g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	作 用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
ノスカピン	30mg	せきの中枢に働いてせきをしのぎます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支をひろげ、せきをしのぎます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみのアレルギー症状をやわらげます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
カンゾウ末	750mg	せきをしのぎ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助けます。
キキョウ末	1,000mg	たんをうすめ、出しやすくし、かぜの回復を助けます。
ケイヒ末	500mg	頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助けます。

○添加物として白糖、l-メントール、チョウジ油、ポビドン、アラビアゴム、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。  
(3) 1包を分割し服用した残りを使用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に服用してください。  
(4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）  
(5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

カイゲンファーマ株式会社

大阪市中央区道修町二丁目5番14号