

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 総合感冒薬 **フォルチュア**® 顆粒

第②類医薬品

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. **次の人は服用しないでください。**  
 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人  
 (3)12才未満の小児
2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。**  
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。**  
 (眠気等があらわれることがあります)
4. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**
5. **服用前後は飲酒しないでください。**
6. **長期連用しないでください。**

### 🗨️ 相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**  
 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人  
 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
 (3)高齢者  
 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
 (5)次の症状のある人  
 高熱、排尿困難  
 (6)次の診断を受けた人  
 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、  
 緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 令	1 回量	1 日服用回数
15才以上（成人）	1 包	3 回
12才以上15才未満	2 / 3 包	
12才未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 【成分・分量】

(1.2g×3包中：成人1日量)

成 分	分量	は た ら き
アセトアミノフェン	900mg	解熱鎮痛効果
クロルフェニランマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの不快感をなくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらいで、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、せきをしずめます。
チアミンジスルフィド	24mg	発熱やせき等で消耗しやすいビタミンB <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> を補給し、
リボフラビン	12mg	かぜの回復を助けます。
カンゾウ末	800mg	のどの炎症を抑えます。
無水カフェイン	75mg	血流をよくして、解熱鎮痛作用を助けます。

添加物として、ポビドン、クロスカルメロースNa、マクロゴール、乳糖水和物、D-マンニトール及びメタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるものなので心配はいりません。

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。

(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

株式会社パナケイア製薬「お客様相談係」電話(0766)36-1118  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）