

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

かぜ薬

スパークカプセル

第②類医薬品

スパークカプセルは、非ピリン系かぜ薬で解熱鎮痛成分、鎮咳成分、抗ヒスタミン成分等を配合し、「かぜ」による発熱、痛み、せき、鼻水等の諸症状に効果をあらわします。



使用上の注意

☒ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがあります)

4. 服用前後は飲酒しないで下さい

5. 長期運用しないで下さい



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)授乳中の人は
- (4)水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)
- (5)高齢者
- (6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7)次の症状のある人:高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人:甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
* 薬剤性過敏症 症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、皿尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい　□のかわり、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

<用法用量に関する注意>

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの
凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、
取り出してお飲み下さい。(誤ってそのまま飲み
込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事
故につながります。)



取り出し時にはけがにご注意下さい

【成分分量】 6カプセル(成人1日量)中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	600mg	かぜによる発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みに効果をあらわします。
エテンザミド	498mg	
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	48mg	非麻薬性で、せきの中枢にはたらいてせきをしめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	42mg	気管支をひろげ、せきをしめ、のどを楽にします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ等のアレルギー症状に効果をあらわします。
無水カフェイン	120mg	頭痛をしめます。

添加物としてクロスCMC-Na、メタケイ酸アルミニウムMg、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、黄色5号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限内に服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話：(0748) 88-3180 (大代表)
受付時間：9時から17時まで (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

 滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879