



服用の前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第②類医薬品

新アセマレン

生薬ゴウウ
配合

かぜ薬

かぜは色々な原因で発病します。症状も、くしゃみ、鼻水、せき、発熱等さまざまです。新アセマレンは、鼻やのどの炎症をしずめ、たんを切れやすくする消炎酵素のリンチーム塩酸塩をはじめ、発熱、せき、頭痛など、かぜの諸症状に効果をあらわす有効成分をソフトカプセルにおさめました。中身が液状なので速く溶けます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用や事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。一高熱、排尿困難一
(8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合。

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
口のかわき

【効能・効果】 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- 1.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2.定められた用法・用量を守ること。

【成分・分量】 成人1日服用量(6カプセル)中

成分名	分量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	発熱、頭痛、関節痛をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン塩酸塩	7.5mg	鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せき、たんをしずめます。
無水カフェイン	50mg	眠気をおさえ、頭痛をしずめます。
リゾチーム塩酸塩	90mg (カプ)	たんを切れやすくし、のどの腫れをおさえます。
フルスルチアミン塩酸塩(VB ₁ 誘導体)	6mg	「かぜ」によるビタミンB ₁ の消耗を補い、関節や筋肉の痛みをおさえます。
ゴオウ末	3mg	発熱をしずめ、体力の回復に役立ちます。

添加物として、ポリソルベート80、軽質無水ケイ酸、モノステアリン酸グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、濃グリセリン、酸化チタン、ゼラチンを含有します。

かぜの養生法


- 1.体力の回復と抵抗力を保つため、充分休養を取りましょう。
- 2.かぜをひくとビタミンが消耗します。バランスのとれた食事を心がけ、ビタミンを充分に採りましょう。
- 3.適度な温度と湿度を保ち、部屋の換気を心がけましょう。
- 4.うがい、手洗い、マスクをするなど感染の防止に努めましょう。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

【カプセルのとり出し方】

カプセルの入っているPTPシート
の凸部を指先で強く押して裏面の
アルミ箔を破り、
取り出してお飲み
ください。



(誤ってそのまま
飲み込んだりすると、食道粘膜に
突き刺さる等、思わぬ事故につな
がります。)

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記へお願い致します。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

発売元



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaselyaku.co.jp>

製造販売元

東海カプセル株式会社

静岡県富士市久沢168番地