

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

総合感冒薬

# のどの痛み、せき、発熱、鼻みず **ハヤナ錠**

◆ハヤナ錠は、解熱鎮痛効果のあるアセトアミノフェンや、たんを出しやすくする作用があるクエン酸チペピジン、グアヤコールスルホン酸カリウムをはじめ、7種類の有効成分を配合した総合感冒薬です。のどの痛み、せき、発熱、鼻みずなどのかぜの諸症状を緩和します。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
 

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 授乳中の人
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上(成人)	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成分・分量

1日量(9錠)中

成分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりを抑えます。
クエン酸チペピジン	60mg	せき中枢の異常な興奮を抑えてせきをしずめ、気道粘液の分泌を促進してたんを出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	200mg	たんをやわらかくして出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめます。
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg	発熱時に消耗しがちなビタミンB <sub>2</sub> を補います。

添加剤：乳糖水和物、セルロース、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三酸化鉄 含有

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配はいりません。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。  
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

株式会社パナケイア製薬「お客様相談係」 電話(0766)36-1118  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)