

この添付文書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品

ひきはじめから飲む
総合かぜ薬

ビューンかぜ顆粒

「かぜは万病のもと」と言われ、かぜをひかないように日々の健康管理が大切です。しかし、万一かぜをひいた時は早めに治すことも大切です。

ビューンかぜ顆粒は、洋薬と香蘇散料エキスの相互作用により、かぜの諸症状を改善します。
ビューンかぜ顆粒で早めにかぜを治してください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - フェニルケトン尿症の人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 | 関係部位 | 症 状 | 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|-------|------|-------|---------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ | 精神神経系 | めまい | そ の 他 | 過度の体温低下 |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | 泌 尿 器 | 排尿困難 | | |

まれに下記の高熱な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎 障 害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制* | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量

1日量3包(1包1.5g)中

| 成 分 | 分 量 | は た ら ぎ | |
|-----------------|---------|---|------|
| アセトアミノフェン | 900.0mg | 熱を下げ、痛みをやわらげます。 | |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | くしゃみ・鼻水・鼻づまりを改善します。 | |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 24.0mg | せき中枢及び気管支に作用し、せきを鎮めます。 | |
| ノスカピン | 48.0mg | | |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60.0mg | 不快なたんを除きます。 | |
| グアイフェネシン | 250.0mg | 頭痛、関節・筋肉・のどの痛みをやわらげます。 | |
| 無水カフェイン | 75.0mg | 活性・持続型ビタミンB ₆ 及びB ₁₂ を配合し、消耗しがちなビタミンを補います。 | |
| ビスベンチアミン | 25.0mg | | |
| リボフラビン酪酸エステル | 12.0mg | ふだん胃腸が弱い人がかぜをひいて気分がすぐれないときに用いられる処方で、胃の働きを助け、発汗をうながすことにより、悪寒・発熱・頭痛をやわらげます。 | |
| 香蘇散料エキス | 990.0mg | | |
| カンゾウ…………… | | | 0.5g |
| ショウキョウ…………… | | | 0.5g |
| コウブシ…………… | | | 2.0g |
| ソヨウ…………… | | | 1.0g |
| チンピ…………… | 1.5g | | |

* 原生薬として5.55gに相当します。

添加物として、水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)を含みます。

《成分・分量に関連する注意》

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂(リボフラビン酪酸エステル)によるものですから心配ありません。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

* 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|------------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1包 | 3回 |
| 15歳未満12歳以上 | 2/3包 | |
| 12歳未満 | 服用しないでください | |

《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

養 生 法

- 食事はビタミン・カロリーに富み消化のよいもの、あたたかいもの、水分の多いものを心がけます。
- 部屋に湯気をたて、空気の乾燥を防ぎます。
- 入浴は熱が下がってから1～2日後にします。
- 汗ばんだ下着は早く着替えて、体を冷やさないようにします。
- 無理をせず安静が第一です。安静にすることは体力の回復とともに、かぜの治療を早めます。

〈お問い合わせ先〉 本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

新生薬品工業株式会社

電話番号 0744-52-3330 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元



株式会社 **中京医薬品**

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269