

2013年6月改訂

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

# くしゃみ、鼻づまりなどかぜの諸症状の緩和 ピラトン21顆粒

第2類医薬品

〈漢方薬配合 カッコン湯入り 非ピリン系〉

〈かぜ薬〉



## 使用上の注意



### してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気等があらわれることがあります。）

4. 服用前後は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (6) 次の診断を受けた人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、

(3) 高齢者。

高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

指腸潰瘍、縁内障

(5) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
	裏面もお読みください。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、眠気

4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**効能・効果** かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

**用法・用量** 1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年令	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上 15歳未満	2/3包	
7歳以上 11歳未満	1/2包	
3歳以上 7歳未満	1/3包	

**〈用法・用量に関する注意〉**  
 (1)用法及び用量をお守りください。  
 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
 (3)3才未満の乳・幼児には服用させないでください。

**成分・分量** 1日量3包(1包1.2g)中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	720.0mg	痛みをおさえ、熱をさげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみをおさえます。
無水カフェイン	150.0mg	頭痛をやわらげます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg	たんを出しやすくします。
葛根湯エキス		
カッコン 1.6g マオウ 0.8g	0.8g	
タイソウ 0.8g ケイヒ 0.6g	1,000.0mg	かぜの初期・肩こり。
シャクヤク 0.6g カンゾウ 0.4g		
ショウキョウ 0.2g より製した乾燥エキス		

添加物として乳糖水和物、セルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

### [保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 【消費者相談窓口】

北日本製薬株式会社 電話番号 076-472-1011

受付時間 9:00~16:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

源平製薬株式会社

製造販売元

北日本製薬株式会社

富山県中新川郡上市町若杉55