

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

A

かぜ薬

ジョイスこどもかぜぐすり

【特徴】

こどもは、急に熱を出したり、せきをしたり、かぜの症状が突然あらわれることがあります。そんなときに、少しでも早く楽にしてあげたいという気持ちにこたえるため、熱・鼻みず・せきなどに効く成分をバランスよく配合しました。ジョイスこどもかぜぐすりは、お子さまにも飲みやすく工夫されたかぜ薬です。服用後は、からだをあたためて、静かに休ませてあげてください。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節 (首、わきの下、股の付け根等) のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 (節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。





3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られる場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

かぜの諸症状 (鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒 (発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み) の緩和

用法及び用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
7才以上11才未満	1包 	3回
3才以上7才未満	2/3包 	
1才以上3才未満	1/2包 	
1才未満	服用しないでください 	

<用法及び用量に関連する注意>

- 本剤は、定められた用法及び用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分及び分量 1日量3包 (1包1g) 中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	450mg	かぜによる発熱、のどの痛みをやわらげます。
クロルフェニランマレイン酸塩	3.75mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ等をおさえます。
チペジジンヒベンズ酸塩	37.5mg	せきをしずめ、たんを出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	気管支を広げ呼吸を楽にして、せきをしずめます。
ヘスペリジン	45mg	血行を促進し、冷えた体を温めます。
ニンジン軟エキス	80mg (原生薬として880mg)	かぜにより消耗した体力の回復を促します。

添加物として、D-マンニトール、バレイショテンブン、リン酸水素Ca、クロスカルメロースNa、サッカリンNa、黄色5号、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- 1包を分割した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。