

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

1回1カプセル服用 ゴオウ・持続性ビタミンB1配合

かぜ薬

アスマリン がぜぐすりカプセル

かぜの症状はさまざまで、こじらせるといろいろな病気の原因にもなります。
できるだけ早期に直すことが大切です。


アスマリンがぜぐすりカプセルはかぜの症状の発熱、頭痛、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり等によくきく成分を配合し、体力の消耗をふせぎ、回復力を高める持続性ビタミンB1やビタミンB2、ゴオウを加えた新しいかぜぐすりです。

【配合成分の働き】

アセトアミノフェン
熱を下げ、頭痛や関節・筋肉の
痛みをしずめます。

クロルフェニラミンマレイン酸塩
鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの
アレルギー症状をおさえます。

チアミンジスルフィド リボフラビン
ゴオウ かぜの諸症状で弱った身体を
回復させ、体調を整えます。



無水カフェイン
頭痛をしずめます。

チベピジンヒベンス酸塩
dl-メチルエフェドリン塩酸塩
せきをしずめ、たんを
切りります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （眠気等があらわれることがあります。）

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）授乳中の人。
- （4）高齢者。
- （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （6）次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- （7）次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブスジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
※腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	15歳以上	15歳未満
1回量	1カプセル	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量をお守りください。
- カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

成分・分量 3カプセル(1日量)中に次の成分を含んでいます。

アセトアミノフェン……………	800mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩…	7.5mg
チベピジンヒベンズ酸塩……………	40mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………	30mg
無水カフェイン……………	100mg	チアミンジスルフィド……………	10mg
リボフラビン……………	3mg	(持続性ビタミンB1)	
(ビタミンB2)		ゴオウ……………	3mg

添加物として、乳糖、CMC-Ca、カプセル(ゼラチン、ラウリル硫酸Na、赤色3号、青色1号)を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

配合成分のビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

お客様相談室 ☎058-271-9481 (9:00～17:00 土、日、祝日を除く)

製造販売元 **大生堂薬品工業株式会社**
岐阜市六条大溝3丁目3番17号