

服用前にこの説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第②類医薬品

感冒薬

ブロードミン錠

この糖衣錠は、非ピリン系の解熱鎮痛剤（アセトアミノフェン・エテンザミド）を用いたかぜ薬でのみ易い糖衣錠にしています。寒気を催したり、鼻水・くしゃみなどかぜの初期症状があらわれたら、早めにお飲みになり早く治して下さい。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
（眠気等があらわれることがある。）
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに感染している又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量減少*、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

(裏面に続きます)

間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること □のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量 次の量を食後なるべく30分以内に服用すること。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	3回
5歳以上11歳未満	1錠	3回
5歳未満	服用しないこと	

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。
- 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）。



成分・分量、作用 1日量9錠中に次の成分を含む。

成 分	9錠中	主な作用
アセトアミノフェン	630mg	熱を下げ痛みを和らげる。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	のどの痛みをやわらげ、せきを和らげる。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえる。
ヘスペリジン	30mg	薬味の吸収に関係する血管を増強する。
エテンザミド	450mg	熱を下げ、痛みを和らげる。
クエン酸チペピジン	60mg	せきを和らげ、たんをきる。
チアミン硝化物	10mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB1の補給。
リボフラビン	3mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンB2の補給。
無水カフェイン	75mg	頭痛を和らげる作用がある。

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、パレイシヨデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、タルク、白糖、アラビアゴム、ゼラチン、酸化チタン、炭酸Ca、トウモロコシデンブ、カルナバパウロウ

〈成分に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがある。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先 田村薬品工業株式会社 お客様相談室
06-6203-5151 受付時間10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元 田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50