



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かぜ薬

# トピックG

第②類医薬品

## △ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - (3)授乳中のの人。
  - (4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小兒(15歳未満)。
  - (5)高齢者。
  - (6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (8)次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	呼吸器	息切れ、息苦しさ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難
精神神経系	めまい	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーキンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

裏面も必ずお読み下さい

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

#### 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上 8歳未満	1/3包	
3歳以上 5歳未満	1/4包	
3歳未満の乳幼児	服用しないでください。	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。

2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分・分量】

1日量〔3包(1包:1.2g)〕中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
桂枝湯乾燥エキス カシソウ……2g 計15gを ゲイビ……4g 乾燥エキス シャクヤク……4g 1.5gにし ショウキョウ……1g タイソウ……4g たもの。	400mg	特に、体力の衰えた人のかぜの初期症 状の頭痛、発熱、悪寒などに効果を発 揮します。
エ テ ン ザ ミ ド	500mg	熱を下げ、頭痛やのど、関節、筋肉な どの痛みをしずめます。
アセトアミノフェン	300mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	せきをしずめ、呼吸を楽にします。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	45mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのア レルギー症状を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	脳の血管にはたらいて、頭痛をしずめます。
カフェイン水和物	90mg	添加物として、バレイショデンブン、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸、カルメロースカルシウム、結晶セルロース、ウイキョウ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

#### お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室  
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1  
☎ 0120-415-688  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

#### 副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

#### 製造販売元

日新薬品工業株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1