

解熱鎮痛薬

ノーチカA

ノーチカAは、非ピリン系の鎮痛成分を中心に4種の成分の配合により、頭痛、歯痛、生理痛などの痛みをおさえ、神経をしのぎ、すみやかに症状を和らげます。また、服用後すみやかに胃内で分散するよう製剤された粉くすりです。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある)**4. 服用前後は飲酒しないこと****5. 長期連用しないこと****相談すること****1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人の。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血	その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイフンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死溶解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなツブツブ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒュヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気	
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること	

効能

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

15才以上 1回 1包宛、1日 2回を限度として、なるべく空腹時を避けて服用する。
服用間隔は6時間以上おくこと。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 15才未満の小児には服用させないでください。

成分と作用 (1包 900mg 中)

成 分	分 量	作 用
アセチルサリチル酸	500mg	熱を下げ、頭痛、関節痛などの痛みなどをやわらげます。
アセトアミノフェン	250mg	
プロモバレリル尿素	100mg	神経をしづめ、痛みをやわらげます。
無水カフェイン	50mg	頭痛をやわらげます。

（保管及び取扱い上の注意）

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
(4) 外袋に表示してある配置期限内に服用してください。

本品についての問い合わせ先：

池田薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 076-472-3311 (大代表)

受付時間 平日 8:10 ~ 17:00



製造販売元

池田薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町若杉12