

解熱鎮痛薬

# ノーチカ錠S

ノーチカ錠Sは、非ピリン系の鎮痛成分を中心に5種の成分の配合により、頭痛、歯痛、生理痛などの痛みをおさえ、神経をしづめて、すみやかに症状を和らげます。また、服用後すみやかに胃内で分散するよう製剤された錠剤です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起りやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある）

#### 4. 服用前後は飲酒しないこと

#### 5. 長期連用しないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿瘍）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれる、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(筋肉が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーザー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわされることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効 能

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

### 用 法・用 量

1日2回を限度とし、次の1回量をなるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。

年 令	15才以上	11才以上~15才未満	7才以上~11才未満	5才以上~7才未満
1回量	3錠	2錠	1 1/2錠	1錠

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)5才未満児には服用させないでください。

### 成 分 と 作 用 (6錠中)

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、頭痛、関節痛などの痛みなどをやわらげます。
エテンザミド	600mg	
プロモバレリル尿素	400mg	神経をしづめ、痛みをやわらげます。
無水カフェイン	120mg	頭痛をやわらげます。
チアミンジスルフィド	20mg	消耗しがちなビタミンを補います。

添加物としてステアリン酸Mg、タルク、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、黄色4号(タートラジン)を含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)1錠を分割し服用した残りを服用する場合には2日以内に服用してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (5)外箱に表示してある配置期限内に服用してください。

本品についての問い合わせ先:

池田薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話 (076) 472-3311 (大代表)  
受付時間 平日 8:10~17:00

製造販売元

 池田薬品工業株式会社  
富山県中新川郡上市町若杉12