

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

クミアイ新頭痛錠

頭痛の原因は多種であり、頭痛の場所、発症時刻、持続時間なども多様ですから、頭痛の治療にはクミアイ新頭痛錠の服用とともに原因療法も心がけてください。なお、頭痛の場合一般的に次のことをご留意ください。

(1) 居所の採光と換気をよくする。(2) 熟睡する。(3) 便通を規則正しくする。(4) 精神的過労をさける。(5) コーヒー、アルコール、香辛料をさける。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用前後は飲酒しないこと

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 水痘(みずぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある幼・小児。(15才未満)
(4) 高齢者。
(5) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群 (ステープルス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる、尿量減少。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量8錠中

エテンザミド……………1,000mg アセトアミノフェン…………… 600mg
無水カフェイン…………… 150mg
添加物としてケイ酸Al、炭酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、
カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mgを含有する。

効能・効果 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・
肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用すること。
服用間隔は6時間以上おくこと。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	2回
11才以上15才未満	2.5錠	
8才以上11才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- (1) 用法・用量を厳守すること。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、配置期限内であっても
開封後、品質保持の点からなるべく早く服用すること。

お問い合わせ先

国産薬品工業株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-313-430
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元

製造販売元

 厚生連

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2