

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

速く治したい…

頭痛・生理痛に

セミドン[®]顆粒

解熱鎮痛薬

第2類医薬品

販売名:セミドン顆粒

①速さと効き目を考えた“速効処方”

イソプロピルアンチピリン



アセトアミノフェン



優れた解熱鎮痛効果を発揮！

②胃への負担を考えた“やさしい処方”→胃粘膜保護成分カンソウ(甘草)エキス配合。

③錠剤の苦手な方にものみやすい顆粒タイプ。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



してはいけません！

1

〔次ページにつづく〕

〔前ページからのつづき〕

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。むくみ

(6)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下



まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
* 薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。

2

〔次ページにつづく〕

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

●頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・咽喉痛（のどの痛み）・肩こり痛・腰痛・神経痛・関節痛・抜歯後の疼痛・耳痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざにともなう痛み（ねんざ痛）・外傷痛・骨折痛の鎮痛 ●発熱・悪寒（発熱によるさむけ）時の解熱

【用法・用量】

次の1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	成人（15才以上）	15才未満
1回量	1包 	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は水又はぬるま湯で服用してください。



服用についてのアドバイス



- ①水又はぬるま湯で服用しましょう。コップ1杯（150mL程度）の水又はぬるま湯と一緒に服用しましょう。薬の成分が水で薄められ、粘膜への刺激を少なくします。
- ②空腹時を避けて服用しましょう。空腹時、解熱鎮痛成分は胃を刺激することがあります。食物が胃に入っていれば、食物が胃を保護するので、解熱鎮痛成分の胃に対する刺激が少なくなります。
- ③頭痛の場合は、痛み始めたら早めに服用すると効果的です。
- ④長期連用とは、5日間を目処としています。

3

【成分】（1包 1.5g中）

成分	分量	はたらき
イソプロピルアンチピリン	150 mg	優れた解熱作用と鎮痛効果を有し、アセトアミノフェンと共に、痛みによく効きます。
アセトアミノフェン	250 mg	痛みを感じる中枢に働きかけ、痛みの伝わりをブロックするとともに、解熱作用を有します。
アリルイソプロピルアセチル尿素	60 mg	鎮静作用があり、鎮痛効果を高めるために配合されています。
無水カフェイン	50 mg	頭痛緩和作用を有します。
カンゾウ(甘草)エキス	150 mg (原生薬換算量 750mg)	胃粘膜を保護して、胃の荒れを防ぎます。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>

4