

この説明文書は服用前に必ずお読みください。  
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

4 (一部: 2023年1月改訂)

腰痛・肩こり痛・関節痛に

芍薬・甘草配合 解熱鎮痛薬

販売名: クイックロコ錠

第②類医薬品

# クイックロコ錠



クイックロコ錠は、ACE 処方（アセトアミノフェン、エテンザミドの解熱鎮痛成分および無水カフェイン）に加え、筋肉の緊張をやわらげる芍薬（シャクヤク）エキスおよび炎症をおさえる甘草（カンゾウ）エキス末を配合することにより、腰痛、肩こり痛、関節痛にすぐれた効果を発揮します。また、制酸剤のメタケイ酸アルミニ酸マグネシウムを配合しているため、胃にソフトな解熱鎮痛薬です。



## 使用上の注意 .....



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

#### 3. 服用前後は飲酒しないでください

#### 4. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人の
- (4) 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児（15才未満）
- (5) 高齢者
- (6) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (7) 次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンスジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれなどがあらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。

(裏面に続く)

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

#### …… 効能・効果 ……

- 腰痛・肩こり痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・神経痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

#### …… 用法・用量 ……

次の量になるべく空腹時をさけて、水またはぬるま湯でおのみください。  
また、おのみになる間隔は6時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	2回を限度とする
小児（11才以上 15才未満）	2錠	
小児（7才以上 11才未満）	1錠	
乳幼児（7才未満）	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります）



#### …… 成分・分量 ……


クイックロコ錠は、淡褐色のフィルムコーティング錠で、6錠（成人1日最大量）中に次の成分を含有しています。

成 分	含量（6錠中）	はたらき
アセトアミノフェン	400mg	
エテンザミド	1000mg	熱を下げ、痛みをおさえる
無水カフェイン	200mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる
メタケイ酸アルミニウム マグネシウム	300mg	胃酸を中和するとともに、胃の粘膜を保護する
カンゾウエキス末 (原生薬換算量 756mg)	108mg	炎症をおさえ、痛みをやわらげる
シャクヤクエキス (原生薬換算量 756mg)	151.2mg	筋肉の緊張をやわらげ、痛みをおさえる

添加物としてトウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸カルシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000を含有しています。

#### …… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) PTPシートから出して他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



#### …… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元

第一薬品工業株式会社

富山県富山市草島15番1