

### 効能効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

### 用法用量

大人(15才以上) 1回 1包 11才以上15才未満 1回 2/3包  
 8才以上11才未満 1回 1/2包 5才以上8才未満 1回 1/3包  
 3才以上5才未満 1回 1/4包 3才未満は服用しないでください。  
 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。  
 用法用量に関連する注意：小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

- 注意**
- 次の人は服用しないでください。  
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、カゼ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - 服用が適さない場合があるので服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 服用に際しては、説明書をよく読んでください。
  - 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - 小児の手の届かない所に保管してください。
  - 本剤は使用期限内に服用してください。  
 なお、期限を過ぎたものは服用しないでください。

### 成分分量(1.15g×2包中)

アセトアミノフェン..... 600mg  
 エテンザミド.....1000mg  
 カフェイン水和物..... 240mg  
 添加物：バレイシヨデンブン、軽質無水ケイ酸、リン酸水素カルシウム



2包(1包1.15g) (250)

製造番号

高市製薬株式会社

使用期限

奈良県高市郡明日香村野口10  
 TEL0744-54-2514

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第②類医薬品

づつう はいた  
 痛み 熱に  
 解熱鎮痛薬

フクヤノカツA



神  
 経  
 痛

熱  
 さ  
 ま  
 し

福 高市製薬株式会社



## 解熱鎮痛薬使用上の注意

### してはいけないこと



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

- 次の人は服用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。

### 相談すること



- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

<裏面へ続く>

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書及び外装を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

- 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書及び外装を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 〈保管及び取扱い上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)