

販売名: 高砂ボウイ 第2類医薬品

---

日本薬局方 **ボウイ**

---

容量 500g 刻

Lot

袋の裏面も必ずお読みください。




4 987574 110211




**高砂薬業株式会社**  
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

日本薬局方 **ボウイ** 第2類医薬品  
高砂ボウイ

 **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
・医師の治療を受けている人。
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

 **使用上の注意**

**【効能又は効果】**  
次の症状の緩和：筋肉痛、神経痛、関節痛

**【用法及び用量】** 成人(15歳以上)は1日量 10g を、水約 600 mL をもって煮て約 400 mL に煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間 3 回に分服する。  
(食間とは、食後2~3時間)

**高砂薬業株式会社**  
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

お客様相談窓口  
☎ 072-977-7151

副作用被害 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)  
救済制度 <http://www.pmda.go.jp/>

1901

**—— 保管及び取扱上の注意 ——**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります)
- 気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封するとその効果は失われますので、次の点に御注意ください。
  - ・なるべくお早めに御使用ください。
  - ・輪ゴム、クリップ等で確実に封止して保管してください。
 (吸湿の防止・虫や異物混入の防止)

◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。