

TRADE

MARK



づつう



神経痛

第②類医薬品

生理痛

高級 ファイン

非ピリン系 高級ファイン

第②類医薬品

成分・分量 1日量(2包)中、1包量1000mg

アセトアミノフェン	600mg	無水カフェイン	150mg
プロモバレリル尿素	400mg	添加物としてグリセロリン酸Ca、軽質無水ケイ酸を含む。	
エテンザミド	700mg		

効能効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。
- (2) 悪寒・発熱時の解熱。

用法・用量

15才以上(大人)	1回1包宛
11才以上15才未満	1回 $\frac{2}{3}$ 包宛
7才以上11才未満	1回 $\frac{1}{2}$ 包宛
3才以上7才未満	1回 $\frac{1}{3}$ 包宛
1才以上3才未満	1回 $\frac{1}{4}$ 包宛

いずれも1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。
幼・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

注意

1. 次の人は服用しないこと。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
5. 直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい所に保管すること。
6. 小児の手のとどかない所に保管すること。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



外袋
内袋

3包入 ¥300.+税

使用期限

製造販売元 富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175

2015年9月(記載要領変更に伴う改訂)

この説明書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読み下さい。

第②類医薬品

づつう・神経痛・生理痛 高級ファイン



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないで下さい
5. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師、又は登録販売者に相談して下さい
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(裏面もお読み下さい)

皮膚粘膜眼症候群 (ステイプル・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするとゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする。息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師、又は登録販売者に相談して下さい。
眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。
- (2) 幼・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに薬剤がのどにつかえることのないように服用させて下さい。
- (3) 定められた用法、用量を厳守して下さい。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 幼・小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になつたり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせ先

富山薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 (076) 435-0139

受付時間9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

富山薬品株式会社

富山市四方西岩瀬石瀬175