

TO



TO

TRADE

MARK

齒痛・頭痛・神經痛

頭痛・生理痛



齒痛・神經痛

新ケロチン

第②類医薬品

Toyama Yakuhin Co., Ltd.
Toyama Japan

TO

製造発売元

富山薬品株式会社

TO

新ケロチン

第②類医薬品

有効成分及び分量 1日量(2包)中

アスピリン…………… 1,200mg・アセトアミノフェン…………… 240mg
 無水カフェイン…………… 120mg・ケイヒ末…………… 100mg
 添加物としてリン酸水素Ca水和物、バレイシヨデンブンを含む。
 1包量 1,000mg

効能又は効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15才以上(成人) 1回…………… 1包 宛
 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。
 服用間隔は6時間以上おくこと。

使用上の注意

1. 次の人は服用しないこと
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)15才未満の小児。
 - (4)出産予定日12週以内の妊婦。
2. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

製造発売元

富山薬品株式会社
 富山市四方西岩瀬石瀬175

副作用被害救済制度
 ☎0120-149-931

3包入 ¥300.+税



この説明書は、ご利用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

H27年4月(記載要領変更に伴う改訂)

第②類医薬品

新ケロチン

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起きやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15才未満の小児。
 - (4) 出産予定日 12 週以内の妊婦。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
3. 服用前後は飲酒しないこと。
4. 長期連用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は「副作用の可能性」があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

(裏面もお読みください)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名前	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小脳泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼ、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる。疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害者救済制度 ☎ 0120-149-931

富山薬品株式会社 (お客様相談口)

☎ フリーダイヤル 0120-36-0139

月～金 9:00～17:00 (祝日を除く)

製造販売元 **富山薬品株式会社**
富山市四方西岩瀬石瀬175