



prevention and care

第②類医薬品 非ピリン系 新スッキリA錠 品目番号 奈3巻82-258

**効能又は効果**

(1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
(2) 悪寒・発熱時の解熱

**成分及び分量 1日量(6錠)中**

日局 アセトアミノフェン ..... 900mg  
日局 エテンザミド ..... 800mg  
日局 無水カフェイン ..... 240mg  
日局 プロモバレリル尿素 ..... 600mg  
添加物としてセルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース及びマクロゴールを含有する。

**配置期限 製造番号**

**用法及び用量**

15歳以上 ..... 1回 2錠  
7歳以上15歳未満 ..... 1回 1錠  
1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさせて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。  
**注意**

1. 次の人は服用しないこと。  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。  
3. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。  
4. 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。

**発売元 株式会社 田原兄弟社**  
奈良県橿原市見瀬町679

**製造販売元**  
寧薬化学工業株式会社  
奈良県大和高田市旭南町2-25

12錠入(2日分) ¥ 700+税

**紙箱**  
**成型シート**

この説明文書はお薬とともに保管してください。  
また、服用時によくお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
  3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)
  4. 服用前後は飲酒しないこと
  5. 長期連用しないこと

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人は。(4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかるっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5)高齢者。(6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、しゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発癢、発赤、赤くなったり皮膚上に小さなプツツ(小膿泡)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性渗出性膿疱症	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
肝機能障害	発熱、発疹、全身のみくみ、全身のだるさ、關節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のみくみ、全身のだるさ、關節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しづれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときの一ぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
眼気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

製造販売元 **寧葉化学工業株式会社**

奈良県大和高田市旭南町2-25

【問い合わせ】電話番号: 0745-22-4151  
受付時間: 9:00~16:00(土日祝日除く)