

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2014年5月：使用上の注意改訂

**第②類医薬品 鎮痛薬 ツートン**



**使用上の注意**

**してはいけないこと**



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

**1. 次の人は服用しないこと**

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと**

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

**3. 服用前後は飲酒しないこと**

**4. 長期連用しないこと**

**相談すること**



**1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児（7歳以上15歳未満）。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
中毒性表皮壊死症 急性汎発性発疹性膿疱症	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
肝機能障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューとなる、息苦しい等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2)悪寒・発熱時の解熱

### 【用法・用量】

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけ、水又はお湯で服用すること。服用間隔は6時間以上おくこと。

年齢区分	服用量(1回量)	年齢区分	服用量(1回量)
15才以上	1包	11才以上15才未満	2/3包
7才以上11才未満	1/2包	7才未満	服用しないこと

### (用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 【成分・分量・はたらき】 1日量 2包(2,000mg)中

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	600mg	炎症を抑え、頭痛、歯痛、関節の痛みをやわらげ、熱を下げます。
エテンザミド	800mg	痛みをしずめ、熱を下げます。
無水カフェイン	100mg	痛みをおさえる成分の働きを助けています。

添加物: 乳糖水和物、カルメロースナトリウム

### 【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限(外袋記載)を過ぎた製品は服用しないこと。

### お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)