

NEW - MEDICINE  
**TAIKO-SAN**

TRADE



MARK

肩かたこり痛

神経痛しんけいとう

のむ・きく

第②類医薬品

成光  
**大虎散**

神経痛・肩こり痛

うつつた  
ほった



# 成光大虎散

## 成分分量 (1包1.2g)中

エテンザミド	250mg
無水カフェイン	50mg
プロモバレリル尿素	200mg
アスピリン(アセチルサリチル酸)	500mg

添加物としてサッカリンNa水和物、黄色4号(タートラジン)、ケイ酸Al、バレイシヨデンブンを含有する。

## 効能効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

## 用法用量

大人15才以上 1回..... 1包  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。  
服用間隔は6時間以上おくと。  
注意) 用法及び用量を厳守すること。



2包入  
(1包1.2g)  
希望小売価格  
¥250+<sup>税</sup>

## 注意

1. 次の人は服用しないこと  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 15歳未満の小児。  
(4) 出産予定日12週以内の妊婦。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
5. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること
6. 配置期限の過ぎた製品は、服用しないこと

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第②類医薬品

配置期限



外装 分包

※ 3-54-97

成光薬品工業株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大塚739



相談窓口 0745-55-0044

服用に際して、この文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第②類医薬品

# 成光<sup>たいこう</sup>大虎<sup>だいこ</sup>散<sup>さん</sup>

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、 胸やけ、胃もたれ、腹痛、 下痢、血便、胃腸出血	そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止ま りにくい、出血、発熱、のどの痛み、 背中の痛み、過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をすするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。



**成光薬品工業株式会社**  
〒635-0834 奈良県北葛城郡広陵町大塚739  
TEL 0745-55-0044 FAX 0745-55-5265

